

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหามาจากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุก โดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน ด้วยเหตุนี้การควบคุมป้องกันโรคต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากประชาชน องค์กรชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ได้จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีเป้าหมายเพื่อใช้กำกับและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ว่ามีปัญหาอย่างไร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งในการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนี้ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลในการลดโรคได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อจึงได้จัดทำโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๔ ขึ้น เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๖๗...(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ซึ่งงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล บ้านตาก มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้สุศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบรัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น

ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลโพรงมะเดื่อ

๒.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จัดตั้งเมื่อ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ ๒๖.๔๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๕๑๑.๒๕ ไร่ มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลหนองงูเห่า ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลวังเย็น ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพญา อำเภอเมืองนครปฐม
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม และตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดนครปฐม

๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

- สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีระบบชลประทานไหลผ่าน

๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น แบ่งเป็น ๓ ฤดู ได้แก่

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

๒.๔ ลักษณะของดิน

- ลักษณะเป็นดินดำ และปนทรายบางส่วน

๒.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

- คลองชลประทาน
- บ่อดินและบ่อทรายเก่า
- คลองดินธรรมชาติ
- ลำห้วย
- บ่อน้ำบาดาล พร้อมหอดักประปา ครอบคลุมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จำนวน ๔๒ หอถึง




สัญลักษณ์แผนที่



แผนที่แสดงเขตตำบล

หมู่	ชื่อ	พื้นที่ (ตร.กม.)	พื้นที่ (ไร่)
1	บ้านดอน	0.81134320	508.709392
2	บ้านดอน	1.54472791	984.848446
3	บ้านดอน	1.95094675	1228.72921
4	บ้านดอน	2.88270936	1801.68885
5	บ้านดอน	3.16688871	1979.30669
6	บ้านดอน	1.82817157	1142.60723
7	บ้านดอน	2.28191318	1426.19824
8	บ้านดอน	2.19444512	1371.62792
9	บ้านดอน	3.11883594	1949.278124
10	บ้านดอน	0.74878191	468.238688
11	บ้านดอน	1.86415177	1173.23241



ความกว้างของพื้นที่ 100 เมตร

แผนที่ภาคี

1:34,000

ชื่อพื้นที่	บ้านดอน
ชื่อตำบล	บ้านดอน
ชื่ออำเภอ	บ้านดอน
ชื่อจังหวัด	บ้านดอน
ชื่อประเทศ	บ้านดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทะเล อ.เมืองกาญจน์ จ.กาญจน์ (ปีงบประมาณ 2562)

ตำบลโพธิ์ทะเล

พื้นที่โดยรวม : 28.828678866546 ตารางกิโลเมตร

๒.๒ ด้านการเมือง / การปกครอง

๒.๒.๑ เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ มีเขตการปกครอง ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๒ บ้านหัวทุ่ง
๒. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนางแช่
๓. หมู่ที่ ๔ บ้านหุบรัก
๔. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองลาดหญ้า
๕. หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อมพยุศ
๖. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแหม
๗. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหมา
๘. หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยหนองกร่าง
๙. หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่
๑๐. หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองจอก
๑๑. หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งคล้อ

๒.๒.๒ ฝ่ายบริหาร

ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ ๑๑ หมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ คน ส่วนฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน

๒.๓ ประชากร

๒.๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากร แยกชายหญิง และจำนวนหลังคาเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ชาย(คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	จำนวนหลังคาเรือน
๒	บ้านหัวทุ่ง	๒๗	๓๐๕	๕๘๒	๑๙๕
๓	บ้านหนองนางแช่	๔๘๖	๔๘๑	๙๖๗	๒๗๘
๔	บ้านหุบรัก	๔๘๗	๔๗๐	๙๕๗	๓๖๓
๖	บ้านหนองลาดหญ้า	๔๘๖	๕๑๗	๑,๐๐๓	๓๖๗
๗	บ้านอ้อมพยุศ	๖๐๐	๖๔๓	๑,๒๔๓	๓๔๓
๙	บ้านหนองแหม	๓๘๐	๔๒๒	๘๐๒	๒๒๔
๑๑	บ้านหนองหมา	๒๙๖	๓๒๑	๖๑๗	๒๙๖
๑๔	บ้านห้วยหนองกร่าง	๘๒๐	๘๗๓	๑,๖๙๓	๔๗๘
๑๕	บ้านใหม่	๔๓๘	๔๔๒	๘๘๐	๒๗๕
๑๖	บ้านหนองจอก	๒๘๒	๒๗๒	๕๕๔	๑๕๖
๑๗	บ้านทุ่งคล้อ	๒๙๓	๒๙๐	๕๘๓	๑๘๐
รวม		๔,๘๔๕	๕,๐๓๖	๙,๘๘๑	๓,๑๕๕

๒.๔ สภาพทางสังคม

ประชาชนในตำบลโพรงมะเดื่อ มีความเป็นอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๔.๑ การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาดหญ้า

- โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลโพรงมะเดื่อ

- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนวัดหุบรัก และโรงเรียนวัดศรีวิสารวา

๒.๔.๒ สาธารณสุข

๒.๔.๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบรัก

๒.๔.๒.๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำทุกหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน

๒.๔.๒.๓ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๒ แห่ง

๒.๔.๒.๔ อัตราการมีและใช้ส้วม ๑๐๐ %

๒.๔.๒.๕ มีการคัดแยกขยะ

๒.๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ไม่มีเหตุอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้น เนื่องจากมีการเฝ้าระวังของผู้นำชุมชนและตำรวจท้องที่อย่างสม่ำเสมอ มีกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและแหล่งชุมชน มีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบหรือป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก มีการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

- สถานีตำรวจ จำนวน ๑ แห่ง คือ สภ.โพรงมะเดื่อ

- บัณฑิตตำรวจตำบล จำนวน ๑ แห่ง คือ บัณฑิตสายตรวจบ้านนา

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โพรงมะเดื่อ

๒.๔.๔ ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จากการได้รับการประสานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยเหลือและบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้น พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อไม่พบรายงานปัญหาที่เกิดจากผู้ติดยาเสพติด เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหายาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการล้างแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

๒.๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาชุมชน

- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- ประสานการทำบัตรผู้พิการ

- สำรวจให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสไว้ที่พึง ตามอำนาจหน้าที่

- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

๒.๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

- ถนนสายหลักของตำบลและหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน

๒.๕.๒ การไฟฟ้า

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่ใช่ที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

๒.๕.๓ การประปา

- ประชาชนมีน้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภคทุกครัวเรือน มีห้องประปาครบทุกหมู่บ้าน ไม่มีประชาชนที่ไม่มีน้ำประปาใช้

๒.๕.๔ โทรศัพท์

- ประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ สำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร

๒.๕.๕ ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

- บริการไปรษณีย์เอกชน
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน
- บริการให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะเพียงพอ แต่หากประชาชน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถยืมใช้ได้

๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

๒.๖.๑ การเกษตร

- ปลูกผักล้มลุก เช่น ผักบุ้ง กระชาย ข้าวโพด อ้อย
- ไม้ยืนต้น (ผลไม้)

๒.๖.๒ การประมง

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เช่น กุ้งก้ามกราม

๒.๖.๓ การปศุสัตว์

- เลี้ยงวัวขุน
- เลี้ยงปลาสวยงามเพื่อส่งออก

๒.๖.๔ การบริการ

- ปั้มน้ำมัน จำนวน ๒ แห่ง

๒.๖.๕ การท่องเที่ยว

- ไม่มี

๒.๖.๖ อุตสาหกรรม

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน ๑๔ แห่ง

๒.๖.๗ การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อมพยศ
- กลุ่มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งคล้อ
- กลุ่มอาชีพขนมก้วยซ่าย หมู่ที่ ๗ บ้านอ้อมพยศ
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๖

๒.๖.๘ แรงงาน

- ประเภทแรงงานทั่วไป มีทั้งคนในพื้นที่ คนภาคอีสาน และแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า
- ประเภทแรงงานฝีมือ (โรงงาน) คนในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า

๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๒.๗.๑ การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๐ % ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ มีศาสนสถาน ดังนี้

- วัดอินทราราม (หุบรัก)
- วัดศรีวิสารวาจา
- วัดรัตนรังสี
- วัดใหม่สันติสุข
- วัดศิริไชยาราม

๒.๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีแห่ธงสงกรานต์
- งานประจำปีของศาลเจ้า ๕ แห่ง
- งานปิดทองประจำปีของวัดในเขต อบต.โพรงมะเดื่อ

๒.๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษาถิ่น

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตสมุนไพรพญาวานร
- ภาษาถิ่น ภาษาไทยและภาษาลาวครึ่ง หมู่ที่ ๒ , ๑๑ และหมู่ที่ ๑๗

๒.๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- ไม่มี

๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๘.๑ น้ำ

- ลำห้วยหนองกร่าง หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย

๒.๘.๒ ป่าไม้


- ไม่มี

๒.๘.๓ ภูเขา

- ไม่มี

๒.๙ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ



๒.๙.๑ งานบริการรับเรื่องร้องทุกข์

- ศูนย์ดำรงธรรมระดับตำบล
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ

๒.๙.๒ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - รถยนต์ | จำนวน ๕ คัน |
| - รถกระบะเข้าพร้อมเครื่องยนต์ | จำนวน ๑ คัน |
| - รถบรรทุกขยะ | จำนวน ๒ คัน |
| - รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | จำนวน ๑ คัน |
| - รถจักรยานยนต์ | จำนวน ๕ คัน |
| - เครื่องพ่นหมอกควัน | จำนวน ๕ เครื่อง |
| - รถแบ็คโฮ | จำนวน ๑ คัน |
| - รถหน้าตักหลังขุด | จำนวน ๑ คัน |

ส่วนที่ ๓

หลักการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

นิยามศัพท์

เพื่อให้ผู้ประเมินมาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความเข้าใจตรงกัน จึงกำหนดนิยามของคำที่ใช้เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์และตัวชี้วัดมาตรฐาน ดังนี้

สสอ. หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในระดับอำเภอ

สสจ. หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในระดับจังหวัด

สคร. หมายถึง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ราชบุรี หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในระดับเขต

การสอบสวนเฉพาะราย หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานการสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วย หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ทีมควบคุมโรคได้รับแจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ทีมควบคุมโรค หมายถึง ทีมที่มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โรงพยาบาล หรือ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

ผู้ป่วยรายแรก (Index case) หมายถึง ผู้ป่วยรายแรกที่เกิดการติดเชื้อเมื่อมีการระบาดของเหตุการณ์นั้นๆ

ค่า HI (House Index) หมายถึง ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่พบในหมู่บ้าน/ชุมชน คือร้อยละของบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่ทำการสำรวจ

$$HI = (\text{จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ} \times 100) / \text{จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด}$$

$HI > 10$ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่โรค

$HI < 1$ มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่โรค

ค่า CI (Container Index) หมายถึง ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่พบในภาชนะต่างๆ คือ ร้อยละของภาชนะที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย

$$CI = (\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ} \times 100) / \text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}$$

๓.๑ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๓.๑.๑ การป้องกันโรคล่วงหน้า

การดำเนินงานที่สำคัญที่สุดในการควบคุมไข้เลือดออก คือ การป้องกันโรคล่วงหน้าเพื่อมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งต้องดำเนินการก่อนโรคเกิด หากเกิดการระบาดแล้วการควบคุมจะทำได้ลำบากและสูญเสียงบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น พื้นที่เป้าหมายของการ

ป้องกันโรคล่วงหน้า คือ หมู่บ้าน และชุมชนทุกแห่ง ฉะนั้นการดำเนินงานป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพทุกพื้นที่จึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคล่วงหน้า เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัสในหน้าแล้ง ดังนี้

๑. วิเคราะห์สาเหตุการระบาดและสอบสวนแหล่งรังโรค

๒. กำจัดแหล่งรังโรคในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดจำนวนลูกน้ำยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด คือ ให้มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ($HI \leq 10$, $CI = 0$)

๓. ระวังการแพร่เชื้อในพื้นที่ด้วยการเฝ้าระวังโรค ค้นหาผู้ป่วย และตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว

๓.๑.๒ การควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด

เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในชุมชนหรือหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการควบคุมโรคด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้โรคไข้เลือดออกสงบโดยเร็วที่สุด โดยดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก กำจัดหรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านและรอบๆ บ้านผู้ป่วย เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปยังชุมชนอื่นๆ หากเริ่มดำเนินการควบคุมได้ช้า โรคจะแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางจนเกินกำลังที่จะควบคุมได้ โดยปกติแล้วโรคไข้เลือดออกมักจะระบาดในฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน หรือตุลาคมของทุกปี แต่ทั้งนี้สภาพภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันจึงทำให้ช่วงเวลาที่เกิดโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการควบคุมการระบาด คือ การเฝ้าระวังโรคที่รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้รู้การเกิดโรคได้โดยรวดเร็ว ต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ประกาศเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนนั้น พร้อมกับให้สุศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงลายกัด ให้ความรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเด็กป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และวิธีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยควรดำเนินการในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร และประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่เกิดโรค ซึ่งหลังการควบคุมโรคแล้วควรมีค่า $HI = 0$ หรือมีค่าใกล้เคียง ๐ มากที่สุด

๒. ใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาด คือ การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย วิธีการนี้จะลดจำนวนยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกในชุมชน การพ่นเคมีต้องครอบคลุมพื้นที่จะช่วยตัดวงจรการระบาดของโรคลงได้ ทั้งนี้ทีมควบคุมโรคต้องมีความพร้อมในการควบคุมพาหะอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย โดยจะสามารถปฏิบัติการได้ทันที ดำเนินการควบคุมแหล่งแพร่โรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง เมื่อได้รับการยืนยันจากการสอบสวนผู้ป่วย โดย สสอ./รพ.สต./รพ. ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งแพร่โรคจริง ลักษณะการพ่นเคมีควรปฏิบัติตามการกระจายของผู้ป่วย ดังนี้

๒.๑ หากเกิดมีผู้ป่วย ควรดำเนินการควบคุมแหล่งแพร่โรค (หมู่บ้านหรือชุมชน) โดย พ่นสารเคมีในบ้านผู้ป่วย และพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร การพ่นสารเคมีควรดำเนินการ ๓ ครั้ง ในวันที่ ๐, ๓, ๗

๒.๒ หากเกิดมีผู้ป่วยกระจายทั่วไปในชุมชนหรือหมู่บ้านควรพ่นทุกหลังคาเรือนในชุมชน และควรพ่นเคมีให้มีบริเวณกั้นกลาง (Barrier Zone) ที่ปลอดยุงรอบชุมชนนั้นด้วย หากมีหมู่บ้านอื่นอยู่ข้างเคียงก็ควรพิจารณาพ่นเคมีเพิ่มเติมให้แก่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงนั้นด้วย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมโรคไข้เลือดออก การใช้เคมีภัณฑ์พ่นกำจัดยุงลายจะดำเนินการใน ๒ กรณี กรณีแรก คือ การพ่นเคมีเพื่อป้องกันโรคล่วงหน้า ควรดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง โดยเป็นมาตรการเสริมให้กับมาตรการหลัก คือ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถ้าหากควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วอาจไม่จำเป็นต้องพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย กรณีที่สอง คือ การพ่นเคมีเพื่อควบคุมการระบาดในชุมชนที่เกิดมีผู้ป่วยขึ้นแล้ววัดดูประสพ เพื่อกำจัดยุงลายที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกให้หมดไปโดยเร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อ

๓.๒ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามระยะเวลาดำเนินการ

๓.๒.๑ ระยะที่ ๑ การป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัส

เป็นการดำเนินงานระยะที่ ๑ (Phase ๑) เดือนมกราคม - เดือนเมษายน เป็นช่วงที่มีความหนาแน่นของยุงแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และจำนวนผู้ป่วยน้อยที่สุด จึงมีเชื้อไวรัสหมุนเวียนในชุมชนน้อยที่สุด ดังนั้นในช่วงนี้ หากสามารถดำเนินการควบคุมโรคโดยจัดการให้มีแหล่งเพาะพันธุ์และจำนวนลูกน้ำยุงลายลดต่ำลงได้มากเท่าไรจะยิ่งเป็นการช่วยลดจำนวนยุงพาหะที่จะก่อให้เกิดโรคในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ระยะการระบาดได้มากขึ้น เป็นการช่วยลดการเกิดโรคไข้เลือดออกให้น้อยที่สุด หากดำเนินการในช่วงที่เกิดการระบาดแล้ว คือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม จำนวนผู้ป่วยกำลังสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การควบคุมจะทำได้ยากและสูญเสียงบประมาณเพิ่มมากขึ้น พื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาดังนี้

ขั้นที่ ๑ วิเคราะห์ต้นตอการระบาดและสืบค้นแหล่งรังโรค วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการจัดการในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ ต่อไป

ขั้นที่ ๒ กำจัดศักยภาพของแหล่งแพร่โรค

- กำจัดภาชนะเสี่ยงที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญในพื้นที่
- จัดการแหล่งเพาะพันธุ์โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม ได้แก่ วิธีทางกายภาพ ชีวภาพ ใช้สารเคมี
- กวาดล้างลูกน้ำยุงลายให้ลดลงต่ำที่สุด ค่า HI, CI ในหมู่บ้าน/ชุมชน มีค่าใกล้ ๐ มากที่สุด

ขั้นที่ ๓ ระวังการแพร่เชื้อ

- เฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วย ส่งตรวจวินิจฉัย และควบคุมยุงพาหะโดยเร็ว
- แนะนำวิธีการป้องกันยุงกัด

๓.๒.๒ ระยะที่ ๒ การควบคุมโรคช่วงระบาด

ระยะที่ ๒ (Phase ๒) เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เพื่อเป็นการป้องกันโรคมิให้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นควรเร่งรัดในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล วัด มัสยิด และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งควรมี

๑. ระบบการรายงานที่รวดเร็ว
๒. ความทันเวลาในการควบคุมโรค
๓. มาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

๓.๒.๓ ระยะที่ ๓ การควบคุมหลังการระบาดของโรค

ระยะที่ ๓ (Phase ๓) เดือนกันยายน - ธันวาคม เป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคแล้วต้องมีการควบคุมการระบาดของโรคให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ต้องระวังการแพร่เชื้อ เฝ้าระวังโรค ค้นหาผู้ป่วย ส่งตรวจ วินิจฉัย และควบคุมยุงพาหะ โดยดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑. ระบบการรายงานที่รวดเร็ว
๒. การสอบสวนโรค
๓. ความทันเวลาในการควบคุมโรค
๔. มาตรฐานการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

๕. ประเมินผลการดำเนินงาน ได้แก่ การประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย การประเมิน ประสิทธิภาพของการควบคุมโรคระดับอำเภอ

ส่วนที่ ๔

การปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่ออันตรายที่ระบาดในประเทศไทย และเป็นโรคประจำถิ่นโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีน้ำขังทำให้ยุงชุกชุม ซึ่งเอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงการกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความตระหนัก และร่วมมือกันช่วยลดปริมาณพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างจริงจัง สม่ำเสมอและต่อเนื่องการร่วมมือกันทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก สาเหตุการเกิด โรคเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มี ๔ ชนิด คือ เดงกี ๑, ๒, ๓, ๔ การติดต่อของโรคมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดย ยุงลายจะกัดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนปกติ จะถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนปกติ ยุงลายที่นำโรค ไข้เลือดออกในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นยุงลายบ้านที่มีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ในภาชนะที่มีน้ำขัง อายุและเพศ ผู้ป่วยเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่จากรายงานทางระบาดวิทยา พบว่า กลุ่มอายุที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มากที่สุด คือ เด็กอายุ ๕ – ๑๔ ปี พบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ผู้ที่ป่วยแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก และถ้าเป็น ซ้ำครั้งต่อมา ผู้ป่วยจะมียาการรุนแรงและจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง ช่วงเวลาระบาดพบได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากใน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม อาการ ผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมีไข้สูงลอยไม่ลด (ประมาณ ๓๘.๕ – ๔๐ องศาเซลเซียส) ๒ – ๗ วัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน บางคนจะปวดท้อง แขนงทอง หลังจากมีไข้ ๒ – ๓ วัน มักจะมีจุดแดงที่ผิวหนัง อาจมีเลือด กำเดาออก เลือดออกตามไรฟัน อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระสีดํา เมื่อไข้ลดลงจะเริ่มหายเป็นปกติภายใน ๗ วัน แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะช็อกหลังจากไข้ลด คือ มือ-เท้าเย็น ซึม กระสับกระส่าย ปัสสาวะน้อยลง ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที่อาจเสียชีวิตได้ อาการ สำคัญที่แตกต่างจากไข้หวัด คือ ไข้เลือดออกไม่มีน้ำมูก ไม่ไอ แต่จะปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก อาการอันตรายที่ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว ในระยะไข้ลดลง ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก คือ มือ – เท้าเย็น ซึม กระสับกระส่าย ปัสสาวะน้อยลง ถ้าไม่ได้รับ การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที่อาจเสียชีวิตได้

การป้องกัน

โดยป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ด้วยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังนี้

๑. การป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดย

๑.๑ นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด

๑.๒ จุดยากันยุงหรือใช้ยาทากันยุง

๑.๓ ไม่อยู่ในบริเวณที่อับลมหรือเป็นมุมมืด มีแสงสว่างน้อย และควรเก็บสิ่งของภายในบ้าน ให้เป็นระเบียบ เพราะยุงลายชอบเกาะพักบริเวณมุมมืดของห้อง เครื่องเรือนต่างๆ มุ้ง สายไฟ ราวพาด ผ้า และกองเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเหม็นโคล

๑.๔ อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นโคล เพราะกลิ่นเหม็นโคลจะดึงดูด ยุงลายให้มากัดมากขึ้น

๒. การกำจัดลูกน้ำยุงลายทำได้หลายวิธี ดังนี้

๒.๑ ปิดฝาโอ่งน้ำใช้ – น้ำดื่ม ให้สนิท ทั้งนี้อาจปิดฝา ๒ ชั้น โดยใช้ผ้าขาวบาง หรือผ้า พลาสติกคลุมปากโอ่งก่อนปิดฝา

๒.๒ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในโอ่งน้ำหรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิด ในอัตราส่วนทรายกำจัดลูกน้ำ ๑ กรัมต่อน้ำ ๑๐ ลิตร

๒.๓ เก็บทำลายวัสดุและเศษภาชนะที่ไม่ใช้ในบ้านและบริเวณรอบบ้าน เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง และเป็นที่วางไข่ของยุงลาย

๒.๔ ใส่ผงซักฟอก หรือน้ำส้มสายชู หรือเกลือแกงลงในน้ำที่จานรองขาตู้กันมด หรือเหน้าเตี๊ยมลงในจานรองขาตู้ทุกสัปดาห์ หรือใช้ชันยาเรือ หรือซีเมนต์แทนการใส่น้ำ

๒.๕ ใส่ปลากินลูกน้ำในอ่างบัวและถังเก็บน้ำในห้องน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด

๒.๖ ขัดล้างผิวด้านในของภาชนะเก็บน้ำทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำ เพื่อขจัดไข่ยุงลาย

๒.๗ เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ทุก ๗ วัน หรือใช้กระดาษหรือสาลี่อุดปากแจกัน เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่

๒.๘ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและชุมชนให้สะอาดไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๓. การกำจัดยุงตัวเต็มวัยทำได้หลายวิธี ดังนี้

๓.๑ การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ พ่นสารเคมีในกรณีมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชน

๓.๒ สำหรับในครัวเรือน ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้สเปรย์กระพ่นที่มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป ใช้น้ำผสมผงซักฟอกฉีดพ่นให้ถูกตัวยุง ใช้กับดักไฟฟ้า ซึ่งแสงไฟจะล่อให้ยุงบินเข้ากับดัก แล้วจะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตตาย หรือใช้อุปกรณ์กำจัดยุง เช่น ไม้ตุง เป็นต้น

ข้อควรจำ

- การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย มีประสิทธิภาพลดความหนาแน่นของยุงได้ประมาณ ๓ – ๕ วันเท่านั้น จึงต้องดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงควบคู่ไปด้วยเสมอ

- การพ่นเคมีบ่อยๆ โดยไม่จำเป็นจะทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง ซึ่งจะเกิดผลเสียอย่างยิ่งในการควบคุมการระบาดของโรคเนื่องจากยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสามารถพบได้ทุกหลังคาเรือน จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนทุกหลังคาเรือนต้องช่วยกันดูแลกำจัดลูกน้ำยุงลายและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจดำเนินงาน โดยมีองค์กรหลักในชุมชนช่วยกันดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในระดับท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภารกิจนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประชาชนประมาณร้อยละ ๘๐ ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ำเน่าเสียในหมู่บ้าน ในท่อระบายน้ำ น้ำในคูคลอง แหล่งน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงรำคาญซึ่งไม่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในความเป็นจริง ธรรมชาติของยุงลายชอบวางไข่ในน้ำนิ่ง ใสสะอาด ดังนั้น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจึงมักอยู่ในบ้านและรอบบ้าน ได้แก่ โอ่ง ภาชนะเก็บน้ำในห้องน้ำ จานรองขาตู้กับข้าว แจกัน และยางรถยนต์เก่าซึ่งเป็นทั้งแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและที่หลบซ่อนของยุงลาย รวมทั้งเศษวัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์ เศษขยะที่สามารถรองรับน้ำได้ เช่น ก่ออิฐ โขดน้ำตม กระบองน้ำอัดลม ก่ออิฐฉนวน ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินงานด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อมแล้ว จำเป็นต้องให้ประชาชนร่วมมือดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณบ้านด้วย นอกเหนือจากการดูแลแหล่งน้ำเสียต่างๆ

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อรัฐบาลได้กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีบทบาทหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

- การศึกษา การทะนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
- การสาธารณสุข
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- การจัดให้มีการบำรุงทางน้ำ ทางบก
- การจัดให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- การจัดการให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นๆ
- การจัดให้มีกิจการโรงรับจำนำหรือสถานธนาณูปการ

กิจกรรมสำคัญซึ่งมีระบุไว้ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่วนกิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถช่วยลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ มีอยู่ ๒ กิจกรรม คือ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดให้มีน้ำสะอาดและการประปา จะช่วยลดภาระการกักเก็บน้ำของประชาชน ซึ่งเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้โดยทางอ้อมอีกด้วย

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับท้องถิ่น จะต้องเป็นความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีการคัดเลือกบุคลากรมาบริหารจัดการในท้องถิ่นตนเอง ทำให้เกิดความใกล้ชิดการบริหารจัดการไม่ซับซ้อนและเป็นทางตรงมากขึ้น และจากภารกิจหน้าที่บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นองค์กรหลักสำคัญ โดยเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ช่วยบริหารจัดการให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขยายออกไปสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ใกล้ตัวของประชาชน คือ ในบ้านและบริเวณรอบบ้าน และจากสภาพบ้านในสังคมไทย มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค แทบทุกหลังคาเรือน ทำให้มีโอกาสดังกล่าวแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ในทุกครัวเรือน ในทางปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นไปได้ คือ ช่วยสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตรับผิดชอบของตนเอง โดยดำเนินการดังนี้

๑. เป็นแกนนำและศูนย์กลางในระดับท้องถิ่น ชักชวนองค์กร ชุมชนอื่นๆ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆและประชาชนให้ช่วยกันสำรวจและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง และในสาธารณสถานต่างๆ เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอตลอดปี โดยจัดแบ่งหน้าที่ให้มีทีมติดตามผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน

๒. สนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ เครื่องพ่นเคมี สารเคมีกำจัดลูกน้ำ และสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยหรือเงินงบประมาณเพื่อการดำเนินการ

๓. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๔. ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และส่งข่าวการป่วยหรือสงสัยว่ามีการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน

๕. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์หรือโครงการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

๖. กำหนดกฎระเบียบของท้องถิ่น เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งการกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วิธีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

๑. กำหนดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อยู่ในแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี

๒. กำหนดกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีจำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบอย่างแน่นอน

๓. สนับสนุนให้มีการจัดทีมติดตามตรวจสอบการสำรวจลูกน้ำ อย่างน้อยทุก ๒ สัปดาห์ ในฤดูกาลระบาด (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) และเดือนละ ๑ ครั้ง ในช่วงก่อนฤดูการระบาด (เดือนพฤศจิกายน – เมษายน)

๔. ให้การสนับสนุนการพนเคมี เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก) โดยการจัดซื้อสารเคมี หรือเครื่องพ่น หรืองบประมาณในการดำเนินงาน

๕. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๓ ประการ คือ

คน คือ บุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งได้แก่ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงมาเป็นส่วนใหญ่

เชื้อ คือ ไวรัสแดง มี ๔ ชนิด คือ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ซึ่งมีในกระแสเลือดผู้ป่วยก่อนมีไข้ ๑ วันและระยะมีไข้ประมาณ ๒ – ๔ วัน

ยุงลาย คือ ยุงลายที่มีเชื้อจากการที่ไปกัดผู้ป่วย จะเป็นยุงพาหะนำเชื้อมาสู่คนหากชุมชนใดมีองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการอยู่ครบถ้วน โรคไข้เลือดออกก็สามารถเกิดและระบาดในชุมชนนั้นได้ ในขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสำหรับเชื้อไวรัสยังไม่มีความสำเร็จโดยเฉพาะได้ ดังนั้นกลวิธีควบคุมโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน คือ การควบคุมยุงพาหะนำโรคให้น้อยลง ซึ่งทำได้โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ และการกำจัดยุงตัวเต็มวัย

หลักการควบคุมโรคไข้เลือดออก

แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ การป้องกันโรคล่วงหน้า และการควบคุมเมื่อมีการระบาด

มาตรการป้องกันโรคล่วงหน้า

การป้องกันโรคล่วงหน้า เป็นกิจกรรมดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงฤดูการระบาด โดยลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยให้เหลือน้อยที่สุด ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ การป้องกันโรคล่วงหน้ามีกิจกรรม ดังนี้

๑. ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการป่วย โดยการจัดการบ้านเรือนของตนไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และวิธีการปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก อาจจะทำได้หลายช่องทางด้วยกัน คือ

- ทางสื่อ เช่น เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว
- ทางโรงเรียน โดยให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปถ่ายทอดและไปปฏิบัติที่บ้าน

- แจกเอกสาร เช่น แผ่นพับ คู่มือ
- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ให้เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
- ขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น/พระ ในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน

๒. การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๒.๑ วิธีทางกายภาพ ได้แก่

- ปิดภาชนะเก็บน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่
- เปลี่ยนน้ำในภาชนะ ทุกๆ ๗ วัน เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- จัดการสิ่งแฉะลื้อม เช่น กำจัดแหล่งขยะที่มีภาชนะน้ำขังได้

๒.๒ วิธีทางชีวภาพ ได้แก่

- การปล่อยปลาในลูกน้ำ

๒.๓ วิธีทางเคมี ได้แก่

- ใส่ทรายที่มีฟอส

- การพ่นเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย เป็นวิธีควบคุมยุงลายที่ได้ผลดี แต่ให้ผลเพียงระยะสั้น (เพียง ๓ -๕ วัน) นอกจากนี้ยังมีข้อด้อย คือ ราคาแพง ต้องใช้เครื่องมือพ่น และควรปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้ เพราะเคมีภัณฑ์อาจเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง และอาจทำให้เกิดการดื้อยา ดังนั้น จึงควรใช้การพ่นเคมีภัณฑ์เฉพาะเมื่อจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ดังนี้

- สำหรับประชาชนทั่วไป หากควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและบริเวณบ้านอาจจะซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุงที่มีขายตามท้องตลาดมาใช้ฉีดฆ่ายุงในบ้านเป็นครั้งคราว

- สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมยุง หากพบผู้ป่วยในพื้นที่ ให้ดำเนินการพ่นเคมีภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อดำเนินการแพร่เชื้อ โดยพ่นในบ้านผู้ป่วยและพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร และพ่น ๓ ครั้ง ตามมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข

*การพ่นเคมีกำจัดยุงลายไม่ว่าโดยวิธีใด จะมีผลลดจำนวนยุงได้เพียงระยะสั้น จำเป็นต้องมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมด้วยเสมอ

วิธีการพ่นเคมีกำจัดยุงลาย

สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ใช้กันทั่วไปมี ๒ วิธี คือ

๑. การพ่นฝอยละออง หรือ ยู แอล วี (Ultra Loe Volume) น้ำยาเคมีจะถูกพ่นจากเครื่องพ่นโดยแรงอัดอากาศผ่านรูพ่น กระจายออกมาเป็นฝอยละอองขนาดเล็กมากกระจายอยู่ในอากาศ แล้วอาศัยกระแสลมพัดพาเข้าไปในบ้านเรือน จึงต้องเปิดประตูหน้าต่างขณะพ่น เพื่อให้สัมผัสกับตัวยุงในบ้าน

๒. การพ่นหมอกควัน น้ำยาเคมีจะถูกพ่นโดยอาศัยอากาศร้อนช่วยในการแตกตัวของสารเคมีจากเครื่องพ่นกลายเป็นหมอกควันฟุ้งกระจาย วิธีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้ได้ผลดี จะต้องอบควันในบ้านอย่างน้อย ๓๐ นาที จึงต้องปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้มิดชิด คนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดจะต้องออกมาอยู่นอกบ้านสำหรับอาหารควรปกปิดให้มิดชิด

*การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ใช้วิธีการพ่นหมอกควัน

ข้อควรปฏิบัติในการพ่นสารเคมี

๑. ช่วงเวลาในการพ่นเคมีกำจัดยุง จะต้องดำเนินการในช่วงเวลากลางวันที่ยุงลายออกหากิน

๒. การพนัศมีต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อลดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการพนัศ ประชาชนและสัตว์เลี้ยง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติควรมีสั่งป้องกันตัว เช่น สวมเสื้อผ้าหนาๆ สวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกให้มิดชิด และปฏิบัติให้ถูกวิธีเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการควบคุมยุงได้ดี

๓. ก่อนพนัศมีจะต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า โดยแจ้งให้เจ้าของบ้านและบ้านใกล้เคียงได้รับทราบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการพนัศมี การเลือกสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคควรเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลง แต่มีพิษน้อยต่อคนและสัตว์ และควรมีคุณสมบัติทำให้แมลงตายทันทีเมื่อแมลงโดนสัมผัสด้วยสารเคมีนั้น วิธีการเก็บสารเคมีต้องเก็บรักษาให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและให้สารเคมีคงสภาพได้นานที่สุดไม่เสื่อมคุณภาพ

มาตรการควบคุมเมื่อมีการระบาด

มาตรการหลัก การใช้สารเคมีพนัศมีในบ้านและบริเวณบ้านผู้ป่วยและในรัศมี ๑๐๐ เมตร เพื่อควบคุมการระบาด โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อกำจัดยุงที่มีเชื้อไขเลือดออกให้หมดไปเร็วที่สุด

มาตรการเสริม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และขอความร่วมมือในการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในช่วงระบาดของโรค

๑. สนับสนุนงบประมาณและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งพนัศมีควบคุมการระบาดในชุมชน โรงเรียน และศาสนสถานทุกแห่ง

๒. เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงที่มีการระบาดในชุมชน และต้องไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

๓. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอย่างต่อเนื่อง กรณีไม่ได้รับความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงที่ระบาด

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการทุกหน่วยทราบถึงวิธีการป้องกันโรคไขเลือดออก และอาการที่สงสัยว่าเป็นไขเลือดออก รวมทั้งอาการที่ต้องรีบพบแพทย์

ส่วนที่ ๕

การติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/ โครงการและ ประเมินว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผลจะกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ประโยชน์ของการติดตาม ประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล่าช้าของการดำเนินการ แต่ยังประเมินว่าการดำเนินการใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนดแค่ไหนเพียงไร แล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประโยชน์ในการ ปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อไปได้

๕.๑ เกณฑ์และตัวชี้วัด คือ เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครือข่าย หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง นครปฐม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบรัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อ เนื่องจากงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งนี้มาตรฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจะส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕.๑.๑ ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายหลังจากการณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทราย และ ฟ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่

๕.๑.๒ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแต่ละหมู่บ้าน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฏฐพันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ